

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

29.12.12 № 1136
Ресстраційне посвідчення
№ *ЦА/12057/01/01*

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГУНА-БОВЕЛ

Склад лікарського засобу:

100 мл крапель оральних містять:

діючі речовини: Aloe D2 – 12,435 мл, Carduus marianus D2 – 12,435 мл, Chelidonium majus D2 – 12,435 мл, Collinsonia canadensis D2 – 12,435 мл, Rhamnus frangula D2 – 12,435 мл, Rheum D2 – 12,435 мл, Taraxacum D2 – 12,435 мл, Cholecalciferol D2 – 4,350 мл, Niacin D2 – 3,875 мл, Pantothenic acid D2 – 3,875 мл, Thiaminum hydrochloricum D4 – 0,039 мл, Alumina D6 – 0,044 мл, Alumina D8 – 0,044 мл, Bryonia alba D6 – 0,044 мл, Bryonia alba D8 – 0,044 мл, Colon suis D6 – 0,044 мл, Colon suis D12 – 0,044 мл, Colon suis D30 – 0,044 мл, Kalium carbonicum D6 – 0,039 мл, Kalium carbonicum D8 – 0,039 мл, Kalium carbonicum D12 – 0,039 мл, Natrum carbonicum D6 – 0,039 мл, Natrum carbonicum D8 – 0,039 мл, Natrum carbonicum D12 – 0,039 мл, Nux vomica D6 – 0,039 мл, Nux vomica D8 – 0,039 мл, Rectum suis D6 – 0,039 мл, Rectum suis D12 – 0,039 мл, Rectum suis D30 – 0,039 мл, Skatolum D6 – 0,039 мл, Skatolum D10 – 0,039 мл.

допоміжні речовини: етанол 96%, вода очищена.

Препарат містить 30% об. етанолу.

1 мл препарату містить 21 краплю.

Лікарська форма.

Краплі оральні.

Прозорий розчин від світло-жовтого до жовтого кольору із запахом спирту етилового.

Назва і місцезнаходження виробника.

Гуна С.п.а.

Вул. Пальманова, 69, 20132 Мілан, Італія.

Фармакотерапевтична група.

Комплексний гомеопатичний препарат.

Показання для застосування.

Симптоми, спричинені атонічними та спастичними запорами, дисбіозом, здуттям живота, порушенням функцій товстого кишечника, синдромом подразненого кишечника; при порушеннях функції печінки внаслідок нераціонального харчування; в комплексному лікуванні геморою.

Протипоказання.

Немає.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Під час прийому препарату бажано відмовитися від алкоголю, цукру, приправ, копчених і гострих продуктів, продуктів зі свинини, кави.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Немає досвіду застосування.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Слід враховувати, що препарат містить спирт. У рекомендованих дозах не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом та роботі з іншими механізмами.

Діти.

Застосовують дітям віком від 3 років.

Спосіб застосування та дози.

Вриймати натще. Перед кожним прийомом інтенсивно збовтати 10-15 разів.

Дорослі та діти віком від 12 років: 10-15 крапель 3 рази на добу зі столовою ложкою води за 15 хвилин до прийому їжі або через годину після прийому їжі протягом 2 місяців. На початку лікування за необхідності отримання швидкого результату рекомендований прийом по 10-15 крапель 5 разів на добу протягом 5-7 днів.

Діти: 3-6 років – 5-7 крапель 3 рази на добу (5 разів на добу протягом перших 5 днів прийому);

6-12 років – 7-10 крапель 3 рази на добу (5 разів на добу протягом перших 5 днів прийому).

Курс лікування – 3 місяці.

Передозування.

Не виявлено.

Побічні ефекти.

Небажані впливи невідомі. У випадку появи будь-яких незвичних реакцій хворому слід порадитися з лікарем.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія поки що невідома.

Особливості застосування.

При запорах і колітах рекомендується поєднувати прийом препаратів Гуна-Бовел та Еубіофлор.

При запорах психосоматичного генезу рекомендується поєднувати прийом Гуна-Бовел з Гуна-Протистрес.

Термін придатності.

5 років. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 30 мл крапель оральних у флаконі-крапельниці в картонній коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Угоджено з матеріалами
реєстраційного доось та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу