

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

31.03.2016 № 288

Регістраційне посвідчення
№ 164/4540/01/01

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ПІЛОСЕЛЛА КОМПЗИТУМ (PILOSELLA COMPOSITUM)

Склад лікарського засобу:

Діючі речовини: 100 мл крапель містять: Spironolactonum D4 – 12,2 мл; Hydrochlorothiazide D4 – 12,2 мл; Amiloride D4 – 12,2 мл; Apis D2 – 12,2 мл; Hypophysis suis D12 – 12,2 мл; Berberis TM – 13 мл; Solidago TM – 13 мл; Pilosella TM – 13 мл;

допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.

Препарат містить 30 % об. етанолу.

1 мл препарату містить 21 краплю.

Лікарська форма. Краплі оральні.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий розчин від світло-жовтого до жовтого кольору із запахом сицилу етилового.

Фармакотерапевтична група.

Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості.

Препарат має сечогінну, дезінтоксикаційну, протизанальну дію, що базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, тваринного походження, суїс-органних та алопатичних компонентів у гомеопатичних розведеннях, які входять до складу препарату.

Препарат має чотири терапевтичних ядра:

1 ядро – діуретична та нефропротекторна дія гомеопатичних компонентів (*Berberis TM, Solidago TM, Pilosella TM*);

2 ядро – діуретична дія потенційованих алопатичних компонентів (*Amiloride D4, Hydrochlorothiazide D4, Spironolactonum D4*);

3 ядро – протинабрякова дія (*Apis D2*);

4 ядро – центральна регуляція порушень водно-сольового обміну (*Hypophysis suis D12*).

Клінічні характеристики.

Показання.

У комплексному лікуванні набряків при захворюваннях нирок, серцево-судинної системи, печінки, легенів.

Противоказання.

Індивідуальна чутливість до будь-яких компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При необхідності одночасного застосування препарату з іншими лікарськими засобами слід проконсультуватися з лікарем.

Особливості застосування.

З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого лікар може змінювати тривалість курсу лікування.

Під час прийому препарату рекомендовано відмовитися від алкоголю, цукру, приправ, копчених продуктів, продуктів зі свинини.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Немає досвіду застосування.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

У рекомендованих дозах не впливає, але слід враховувати наявність у складі препарату етанолу.

Спосіб застосування та дози.

Приймати натщесерце. Перед кожним прийомом препарату необхідно активно збовтати розчин 10-15 разів.

Разова доза: дорослим та дітям віком від 12 років – по 20 крапель 2-3 рази на добу. При довготривалій терапії хронічних захворювань – 15-25 крапель вранці.

Разову дозу приймати за 15-20 хвилин до їди або через 1 годину після їди. Краплі слід розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті (можна не розчиняти, а одразу калати під язик).

Курс лікування: 1-2 місяці. При захворюваннях нирок курс лікування можна продовжити після консультації лікаря.

Діти.

Препарат застосовувати дітям віком від 12 років. Досвіду застосування препарату дітям віком до 12 років немає.

Передозування.

У випадку передозування терапія симптоматична.

Побічні реакції.

В осіб із підвищеною чутливістю можливий розвиток алергічних реакцій.

У випадку появи будь-яких небажаних реакцій пацієнту слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності. 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі-крапельниці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25°С.

Упаковка.

По 30 мл крапель у флаконі-крапельниці в картонній коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник.

Гуна С.п.а.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Віа Пальманова, 69 - 20132 Мілан, Італія.

Дата останнього перегляду.



Текст у рукописі: *Текст у рукописі. Миланова В.С. 16.09.2015*